



urologie kempen

Patiënteninformatie

Circumcisio (besnijdenis) bij kinderen



Inhoud

Inhoud	2
Inleiding	3
Wat is een circumcisie?	4
Redenen voor een circumcisie	5
Fimosis	5
Parafimosis	5
Ontstekingen van de eikel en voorhuid	6
Religieus-culturele redenen	6
Hygiënische redenen	6
Seksuele redenen	6
Esthetische redenen	6
Vorbereiding op de ingreep	7
Voor de ingreep	7
De verdoving	7
Kort na de ingreep	7
Verloop van de operatie	8
Duur van de ingreep	8
Wonde en gebruikte operatietechniek	8
Complicaties	8
Richtlijnen en aandachtspunten	9
Wie contacteren bij vragen of problemen?	10

Meer info over de dienst Urologie Kempen op <https://urologiekempen.be/>



Inleiding

Deze brochure biedt u de nodige informatie over een besnijdenis bij kinderen. U leest hierin meer over de behandeling zelf, de verzorging in het ziekenhuis, aandachtspunten en richtlijnen voor thuis. Het is onmogelijk om in deze brochure alle details voor elke situatie te beschrijven. Aarzel daarom niet om zo nodig bijkomende vragen te stellen aan uw uroloog of verpleegkundige.

Algemene informatie over administratie, wat u moet meebrengen, uw verblijf in het ziekenhuis, ontslagprocedure, niet-medische begeleiding, accommodatie, enzovoort vindt u op de websites van de desbetreffende ziekenhuizen.

- voor ziekenhuis Geel: www.ziekenhuisgeel.be
- voor AZ Herentals: www.azherentals.be
- voor Heilig Hartziekenhuis Mol: www.azmol.be
- voor AZ Turnhout: www.azturnhout.be

Voor bijkomende algemene informatie over de behandeling kan u ook terecht op de patiëntenwebsite van de European Association of Urology (www.patients.uroweb.org). We danken hen voor de toestemming om hun illustraties te mogen gebruiken in deze informatiebrochure.



Wat is een circumcisie?

Een circumcisie of besnijdenis is het operatief verwijderen van de gehele voorhuid van de penis of een deel hiervan. Een volledige besnijdenis is het meest gebruikelijk. Hierbij wordt de hele voorhuid verwijderd en zal de eikel zowel bij een erectie als bij de penis in slappe toestand bloot liggen. Een gedeeltelijke besnijdenis is niet altijd mogelijk; dit hangt o.a. af van waar de vernauwing van de voorhuid zich bevindt.



eeu ©2017 patient.uroweb ALL RIGHTS RESERVED

Penis voor en na besnijdenis



Redenen voor een circumcisie

Fimosis




©2017 patient.uroweb ALL RIGHTS RESERVED

Bij een fimosis is de voorhuid zo vernauwd dat deze niet of nauwelijks teruggetrokken kan worden over de eikel. Fimosis kan aangeboren zijn, of veroorzaakt worden door herhaalde infecties van de voorhuid. Een fimosis kan allerlei problemen veroorzaken. Omdat de voorhuid niet teruggetrokken kan worden, kan de eikel eronder niet goed gereinigd worden. Hierdoor kan zich vuil ophopen wat ontstekingen en zo verdere vernauwingen in de hand werkt. Ook de opening van de plasbuis kan vernauwen. Een lange bestaande van fimosis blijft een risicofactor in het ontwikkelen van kanker van de penis. Doo

Parafimosis

Parafimosis ontstaat wanneer een nauwe voorhuid toch wordt teruggetrokken, bijvoorbeeld om de penis te reinigen. Wanneer het dan niet lukt (of vergeten wordt) om de voorhuid terug over de eikel heen te schuiven, wordt de bloedtoevoer naar de weefsels achter deze vernauwing afgesnoerd. Dit leidt tot zwelling en oedeem van de voorhuid achter de vernauwing. Indien deze situatie lang aanhoudt, zal de voorhuid op die plaats afsterven. Op dat moment is onmiddellijk medische hulp nodig. Een arts krijgt de voorhuid mogelijk weer terug over de eikel geschoven. Om een herhaling te voorkomen wordt meestal een besnijdenis uitgevoerd



©2017 patient.uroweb ALL RIGHTS RESERVED



Ontstekingen van de eikel en voorhuid

Dit wordt ook wel balanitis of balanoposthitis genoemd en is een ontsteking van voorhuid en eikel. Deze aandoening kan ontstaan door gebrek aan hygiëne. Ook het gebruik van zeep kan irritaties veroorzaken en zo bijdragen aan het ontstaan van ontstekingen. Het beste kan gewoon helder water gebruikt worden om de penis te reinigen, ofwel een zeep specifiek bedoeld voor intieme hygiëne. Een enkele ontsteking van voorhuid en eikel kan met zalf, baden en antibiotica worden verholpen, maar blijven de ontstekingen terugkomen, dan is een besnijdenis de enige definitieve oplossing.

Religieus-culturele redenen

Voorbeelden zijn moslims en joden die hun kinderen laten besnijden.

Hygiënische redenen

Een besneden penis produceert nauwelijks of geen smegma en is daarom veel makkelijker schoon te houden. Smegma is een stevige witte kaasachtige ruikende substantie, bestaande uit dode afgeschilferde epitheelcellen en neutrale lichaamsvetten.



Vorbereiding op de ingreep

Voor de ingreep

De dag van de operatie komt u met uw kind nuchter op de afdeling. De avond voor de operatie mag uw kind vanaf middernacht niets meer eten.

Slechts 1 ouder mag het kind vergezellen naar het operatiekwartier tot het slaapt. U zal gevraagd worden beschermende kledij (schort, muts en eventueel schoenbeschermers) te dragen gezien het operatiekwartier als reine zone wordt beschouwd.

De verdoving

De operatie vindt plaats onder algemene verdoving.

Duur van de operatie

Uw kind zal een tijdje weg zijn van de kamer. Hierin is ook inbegrepen de tijd die er na de operatie wordt doorgebracht in de ontwaakruimte. De operatie zelf duurt normaal gezien minder dan 30 minuten.




Verloop van de operatie

Voor de ingreep begint, wordt er een infuus geplaatst. Afhankelijk van de leeftijd van uw kind wordt dit voor of na de verdoving gedaan.

Wonde en gebruikte operatietechniek

De verklevingen tussen de voorhuid en de eikel worden losgemaakt. De voorhuid wordt volledig verwijderd en aan de basis van de eikel worden rondom hechtingen geplaatst die vanzelf verdwijnen (meestal na 2 à 3 weken). Deze hechtingen moeten dus nadien niet verwijderd worden. Bij kleinere kinderen kan er ook in plaats van hechtingen wondlijm gebruikt worden.



eeu ©2017 patient.uroweb ALL RIGHTS RESERVED

Na de operatie

Na de operatie mag u samen met uw kind op de ontwaakruimte blijven en daarna terug naar de kamer gaan. Het infuus blijft nog zitten om eventueel pijnstilling toe te dienen.

Ontslag is de dag zelf voorzien.



Complicaties

Complicaties treden op bij minder dan 5% van de besnijdenissen. Ze beperken zich bijna altijd tot de wonde. Als ze zich voordoen gaat het meestal om een nabloeding of een infectie. Dit kunnen vervelende complicaties zijn, maar ze zijn vrijwel altijd heel goed te behandelen.

Richtlijnen en aandachtspunten

Indien er hechtingen worden gebruikt zijn deze oplosbaar en moeten niet verwijderd worden.

Indien de wonde met huidlijm werd gesloten, kan dit er na de eerste 2 weken na de operatie wat vreemd uitzien. Soms zitten er bruingrijze 'korsten' op de wonde die geleidelijk loskomen. Best wordt gewoon gewacht tot deze vanzelf loskomen. Als ze worden losgetrokken, kan een nabloeding ontstaan of kan de wonde (deels) openvallen.

Indien er een verbandje werd aangebracht, mag dit de dag nadien verwijderd worden. Best maakt u het verband nat om het nadien voorzichtig te verwijderen.

De dag na de operatie mag u starten met het aanbrengen van Terra Cortril®-zalf ter hoogte van de eikel.

Kort douchen is toegestaan vanaf de dag na de operatie.

Er wordt best twee weken gewacht met in bad gaan, zwemmen of in de zandbak spelen.

De eikel kan er gedurende enkele dagen rood en gezwollen uitzien. Dit is volkomen normaal en verdwijnt vanzelf.



Wie contacteren bij vragen of problemen?

Deze brochure werd voor u opgemaakt door de dienst Urologie Kempen waarvan de urologen werkzaam zijn op volgende campussen:

Polikliniek Urologie te Geel

Ziekenhuis Geel
J.-B. Stessensstraat 2
2440 Geel
' 014/57 70 21

Polikliniek Urologie te Herentals

AZ Herentals
Consultatieblok 2e verdieping via rode lijn
Nederrij 133
2200 Herentals
' 014/24 65 00

Polikliniek Urologie te Mol

Heilig Hartziekenhuis Mol
Consultatieblok 2e verdieping, oranje route
Gasthuisstraat 1
2400 Mol
' 014/71 20 53

Polikliniek Urologie te Turnhout

Campus Sint-Elisabeth
Route B58
Rubensstraat 166
2300 Turnhout
' 014/40 62 85

Campus Sint-Jozef
Route D25
Steenweg op Merksplas 44, 2300 Turnhout
' 014/ 44 44 35