



# urologie

## kempen

Patiënteninformatie

## Genitale wratten

condylomata acuminata



## Inhoud

Inhoud.....	2
Inleiding.....	3
Wat zijn genitale wratten?.....	4
De ingreep.....	5
De opname.....	5
Voor de operatie.....	5
De verdoving.....	5
Duur van de operatie.....	6
Verloop van de operatie.....	6
Kort na de operatie.....	6
Complicaties.....	7
Richtlijnen en aandachtspunten voor thuis.....	7
Tot slot.....	7
Wie contacteren bij vragen of problemen?.....	8

Meer info over de dienst Urologie Kempen op <https://urologiekempen.be/>



## Inleiding

Deze brochure biedt u de nodige informatie over de behandeling van genitale wratten (condylomata acuminata). U leest hierin meer over de behandeling zelf, de verzorging in het ziekenhuis, aandachtspunten en richtlijnen voor thuis. Het is onmogelijk om in deze brochure alle details voor elke situatie te beschrijven. Aarzel daarom niet om zo nodig bijkomende vragen te stellen aan uw uroloog of verpleegkundige.

Algemene informatie over administratie, wat u moet meebrengen, uw verblijf in het ziekenhuis, ontslagprocedure, niet-medische begeleiding, accommodatie, enzovoort vindt u op de websites van de desbetreffende ziekenhuizen.

- voor ziekenhuis Geel: [www.ziekenhuisgeel.be](http://www.ziekenhuisgeel.be)
- voor AZ Herentals: [www.azherentals.be](http://www.azherentals.be)
- voor Heilig Hartziekenhuis Mol: [www.azmol.be](http://www.azmol.be)
- ❖ voor AZ Turnhout: [www.azturnhout.be](http://www.azturnhout.be)



## Wat zijn genitale wratten?

Dit is een veel voorkomende seksueel overdraagbare aandoening (SOA). Genitale wratten zijn goedaardige huidafwijkingen in het gebied rond de geslachtsorganen en de anus en ontstaan na een infectie met het HPV (Humaan Papilloma Virus).

Er zijn verschillende types HPV, maar niet alle types veroorzaken anogenitale wratten. Ook niet iedereen die besmet is, zal wratten ontwikkelen. Er is geen behandeling tegen het virus zelf, maar wel om de huidletsels die erdoor veroorzaakt worden te verwijderen. De wratten zijn soms nauwelijks

zichtbaar, vooral als ze inwendig aanwezig zijn in de vagina, plasbuis of anus. Een arts kan deze dan toevallig ontdekken tijdens een grondig lichamelijk onderzoek. Behalve een storend uitzicht kunnen deze wratten jeuken of kleine bloedingen veroorzaken.



Bron: huidziekten.nl

Het HPV- virus is zeer besmettelijk en kan behalve door seksueel contact ook op andere manieren overgedragen worden (gezamenlijk gebruik van handdoeken/washandjes, verwisselen van luiers,...). De genitale wratten kunnen enkele weken na infectie verschijnen, maar dit kan ook pas na enkele maanden gebeuren.

Bron: huidziekten.nl

Het is hierdoor moeilijk om te achterhalen door wie (of wat) en wanneer iemand besmet geraakt is.

Het is dan ook aangeraden om kleine letsels zo spoedig mogelijk te behandelen. Ook indien u 1 vaste seksuele partner hebt die al gekend is met een besmetting, laat u nieuwe letsels toch best nakijken of opvolgen door een arts. De behandeling is dan natuurlijk minder dringend gezien het virus reeds bij beide partners aanwezig is.

Wratten kunnen verwijderd worden door aanstippen met bepaalde vloeistoffen of crèmes (vaak toegepast door de huidspecialist/dermatoloog), of door heelkundig ingrijpen (bevriezen, verschroeien, laseren, wegsnijden). Wanneer de wratten verdwenen zijn, blijft het virus nog in het lichaam aanwezig. Veelal komen de wratten na verloop van tijd terug, of je kan opnieuw besmet worden. De nodige voorzorgen dienen dus genomen te worden bij (seksueel) contact om verdere verspreiding tegen te gaan.



## De ingreep

De uroloog brengt via de plasbuis een camera (cystoscoop) tot in de blaas. De arts onderzoekt eerst de blaas en brengt daarna via de cystoscoop een naald in waarmee er ongeveer 20 prikken gegeven worden. Bij elke prik wordt er een kleine hoeveelheid botulinetoxine A ingespoten in de wand van de blaas. De procedure duurt ongeveer 5 minuten.

## De opname

- ❖ U komt op de afgesproken datum en uur naar het ziekenhuis en u laat zich inschrijven aan de opnamedienst.
- ❖ Volgende dingen mag u niet vergeten:
  1. Identiteitskaart
  2. Lijst met thuismedicatie
  3. Thuismedicatie in de verpakking
- ❖ De ingreep wordt in dagziekenhuis gepland. Reken erop dat u niet zelf met de wagen mag rijden indien de ingreep onder algemene verdoving (narcose) plaatsvindt.

## Voor de operatie

- ❖ De dag van de operatie komt u nuchter op de afdeling. De avond voor de operatie mag u vanaf middernacht niets meer eten.
- ❖ Uw arts bespreekt met u of uw bloedverdunners voor de ingreep gestopt moeten worden.
- ❖ U dient best thuis enkele dagen voordien de huid te scheren of trimmen op de plaats waar de letsels zich bevinden. Dit om te vermijden dat we dit vlak voor de ingreep nog moeten doen en om te voorkomen dat er dan wondjes worden gemaakt. Kleine letsels kan u best vooraf met een stift aanduiden.
- ❖ Vlak vóór het vertrek naar de operatiekamer zal u gevraagd worden juwelen, piercings, bril, lenzen, gehoorapparaat, eventuele tandprothesen,... te verwijderen; een operatiehemd aan te trekken.

## De verdoving

Afhankelijk van de grootte en lokalisatie van de letsels, wordt de ingreep onder lokale of algemene verdoving uitgevoerd. Dit spreekt u tevoren af met de uroloog.



## Duur van de operatie

- ❖ U zal een tijdje weg zijn van de kamer. Hierin is ook inbegrepen de tijd die er na de operatie wordt doorgebracht in de ontwaakruimte.
- ❖ De operatie zelf duurt normaal gezien minder dan 1 uur, dit hangt uiteraard sterk af van de hoeveelheid wratten die er behandeld dienen te worden.

## Verloop van de operatie

- ❖ De wratjes worden weggebrand of gelaserd. Grote letsels kunnen weggesneden worden. Hier worden dan hechtingen geplaatst.
- ❖ Ter hoogte van de weggebrande/gelaserde wratten wordt er zalf aangebracht, deze krijgt u ook mee naar huis.
- ❖ Er kan een wrat worden opgestuurd voor microscopisch onderzoek om de diagnose al dan niet te bevestigen.

## Kort na de operatie

- ❖ Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer (recovery) en daarna naar uw kamer op het dagziekenhuis.
- ❖ U hebt een infuus gekregen voor het toedienen van vocht en eventueel iets tegen de pijn of misselijkheid. Als u zich goed voelt, wordt het infuus verwijderd.
- ❖ U mag de dag van de ingreep al naar huis.



## Complicaties

Zoals na elke ingreep is er een kleine kans op een wondinfectie of nabloeding.

## Richtlijnen en aandachtspunten voor thuis

- ❖ Uw arts bespreekt met u of de hechtingen vanzelf vergaan of moeten verwijderd worden achteraf.
- ❖ Voor eventuele pijn na de ingreep mag u een pijnstiller nemen.
- ❖ U mag gerust douchen. Wel is het aan te raden om gedurende twee weken geen bad te nemen of naar het zwembad te gaan.

## Tot slot

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen, dan kunt u terecht bij uw behandelend uroloog of de verpleegkundigen van de polikliniek urologie. Wij hopen van harte dat deze brochure u wegwijs heeft gemaakt in deze procedure.



## Wie contacteren bij vragen of problemen?

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen, dan kunt u terecht bij uw behandelend arts of de verpleegkundigen.

Deze brochure werd voor u opgemaakt door de dienst Urologie Kempen waarvan de urologen werkzaam zijn op volgende campussen:

### **Polikliniek Urologie te Geel**

Ziekenhuis Geel

J.-B. Stessensstraat 2

2440 Geel

' 014/57 70 21

### **Polikliniek Urologie te Herentals**

AZ Herentals

Consultatieblok 2e verdieping via rode lijn

Nederrij 133

2200 Herentals

' 014/24 65 00

### **Polikliniek Urologie te Mol**

Heilig Hartziekenhuis Mol

Consultatieblok 2e verdieping, oranje route

Gasthuisstraat 1

2400 Mol

' 014/71 20 53

### **Polikliniek Urologie te Turnhout**

Campus Sint-Elisabeth

Route B58

Rubensstraat 166

2300 Turnhout

' 014/40 62 85

Campus Sint-Jozef

Route D25

Steenweg op Merksplas 44, 2300 Turnhout

' 014/ 44 44 35